

Bons soins, bon chien



Les maladies de mon chien

- 1- Parasitaires
- 2- Infectieuses

Autres maladies

- 1- L'otite
- 2- Le pneumothorax
- 3- Le Syndrome de dilatation de l'estomac

 Chenilles processionnaires

L'éventration

Trousse de secours

Les soins tout au long de l'année

Visite vétérinaire

La visite juste avant l'ouverture n'est pas nécessaire si vous adoptez le principe d'une visite annuelle, non seulement pour les vaccins, mais pour les différents conseils qui vous seront alors prodigués.

Vermifugation

Attention, les seuls produits efficaces sur tous les parasites et notamment sur les « vers plats » comme celui de l'échinococcose, ne sont délivrables que sur ordonnance.

Parasites externes

Quasiment aucun produit n'empêche les tiques de se fixer sur les chiens. Il est donc préférable d'inspecter et de traiter après la chasse. Pour les autres parasites externes (puces, etc...) protection de fond systématique par collier ou application par « pipette ».



Les maladies de mon chien

🐾 Maladies Parasitaires

La leishmaniose



La leishmaniose est une maladie provoquée par un parasite injecté par un petit insecte : le phlébotome. Les phlébotomes sont des insectes de très petite taille qui ressemblent à de petits moucheron.

Hématophages, les femelles se nourrissent de sang et sont susceptibles de transmettre des maladies graves pour tous les chiens qui voyagent ou habitent tout le long du pourtour méditerranéen.

✚ ▶ Symptômes :


Les symptômes peuvent se résumer par

- Un amaigrissement progressif,
- Des lésions cutanées au niveau de la truffe, des oreilles et des coussinets,
- Des démangeaisons s'accompagnant de chutes de poils,
- Des griffes anormalement longues,
- Des saignements de nez,
- Des muqueuses pâles...



✚ ▶ Aussi, pour bien protéger votre chien, **la meilleure solution reste la prévention**. En effet, en curatif, le traitement de la leishmaniose chez le chien est compliqué et dure toute la vie de votre compagnon.

Schéma de contamination



Sachez que **la leishmaniose est de plus en plus présente en Aveyron**. Maladie confidentielle, elle ne concernait que les départements du sud de la France et chez nous les cas étaient rares.



Aujourd'hui, très certainement du fait du réchauffement climatique **des cas apparaissent fréquemment dans le sud Aveyron**, on en décèle aussi dans les communes du bassin de Decazeville, plusieurs cas seraient à déplorer sur la commune de Nuces, à Espalion et aux alentours de Rodez.

Les chasseurs qui vont régulièrement chasser dans l'Hérault ou le Gard, doivent impérativement faire vacciner leur chien tout comme ceux qui prennent leur chien en vacance au bord de la mer.

La leptospirose



La leptospirose est une maladie bactérienne qui se contracte dans les eaux stagnantes.


Les rongeurs, les rats notamment, constituent un réservoir pour la maladie, en tant que porteurs sains de la bactérie qu'ils libèrent dans l'eau ou dans les aliments lorsqu'ils les souillent de leurs urines.

La bactérie peut passer chez le chien soit par voie orale lorsque celui-ci boit dans des flaques souillées ou à travers la peau ou via des plaies ou des micro plaies lorsqu'il se baigne dans une mare par exemple.


+ ► **Symptômes :**

La maladie peut se présenter sous plusieurs formes :

- On observe des vomissements avec du sang ainsi que des selles colorées en noir du fait de la présence de sang digéré.
- **Il peut arriver que les chiens** n'urinent que très peu ou plus du tout.
- Le chien peut également avoir le **blanc des yeux et les** muqueuses teintées de jaunes (ictère).
- Il arrive également que votre animal **boive beaucoup pour compenser une insuffisance rénale.**
- Encore votre chien peut présenter une fièvre importante (39,5-40°C), être particulièrement fatigué, vomissant tout ce qu'il ingurgite.




Mode de transmission



+ ▶ Prévention

La meilleure prévention contre la leptospirose est la vaccination, avec un rappel annuel.



Cette maladie est très grave, la moindre alerte doit vous conduire à l'amener chez le vétérinaire.



La trachéobronchite infectieuse

La **trachéobronchite infectieuse** canine (TBIC), souvent appelée « toux de chenil », est une maladie particulièrement contagieuse qui se transmet par simple contact.

Aussi, tous les chiens qui rencontrent d'autres chiens sont potentiellement exposés. La TBIC figure parmi les maladies les plus répandues.



Symptômes :

Les symptômes s'apparentent à ceux d'une grippe et se caractérisent par une toux forte persistante et épuisante pour le chien.



Deux formes peuvent être observées :

- **Une forme simple**, avec une toux sèche, survenant par quintes et pouvant être suivie de vomissements. Un écoulement nasal faible est présent. Une évolution favorable est fréquente au bout de 1 à 3 semaines.
- **Une forme compliquée**, qui provoque chez le chien une fatigue intense avec de la fièvre. La toux est productive. L'écoulement nasal est épais. Sans traitement, cette forme évolue le plus souvent vers la mort de l'animal en quelques semaines.

Il est difficile d'éviter la contamination des chiens. La vaccination constitue un moyen efficace pour protéger les chiens contre la trachéobronchite infectieuse canine.



L'otite chez le chien se produit lorsque la peau du conduit auditif est enflammée.

+ D Symptômes :

Les symptômes de l'otite chez le chien se traduisent par :

- Des démangeaisons,
- Une forte production de cérumen,
- Une odeur nauséabonde,
- Une rougeur de l'oreille.



Parmi **les causes d'inflammation** de la peau des oreilles, on citera la **présence d'un corps étranger** comme les **épillets de graminées**.



Une infection parasitaire donne également une inflammation accompagnée de cérumen foncé en grande quantité et de démangeaisons en continu.

Des allergies, des infections bactériennes ou fongiques sont également responsables d'otites.



Dans tous les cas, il faut consulter votre vétérinaire rapidement.

1



2



3



4



5



6



10



11



7



8



9



Ce que vous devez avoir dans votre trousse 1^{er} secours pour chien de chasse

🐾 Liste des vétérinaires les plus proches avec leur numéro de téléphone

1. Bandes Elasto
2. Bande de 10 cm de large Velpeau
3. Rouleau de coton
4. Compresses stériles (petites et grandes)
5. Sparadrap
6. Ciseaux bouts ronds
7. Bétadine ou Biseptine
8. Sérum physiologique
9. Lingettes désinfectante ou gel hydro alcoolique
10. Agrafeuse à peau
11. Pince métallique ôte agrafe
12. Lien pour muselière
13. Gants chirurgicaux
14. Thermomètre
15. Tire tique
16. Linge (qui ne peluche pas)
17. Eau
18. Croquettes

🐾 Prévoir un petit sac plastique (pour ne pas laisser les compresses dans la nature)

La trousse d'urgence doit rester en permanence dans le véhicule (non verrouillé) d'un responsable de la chasse.

L'emplacement pour la journée sera indiqué avant la chasse au cours du rond du matin



Fourchette de prix de 35 € à 48 €



L'éventration

L'attaque par un sanglier est souvent associée à des plaies de l'abdomen ou à des perforations de la cage thoracique (cf. : pneumothorax page suivante)



Avant tout se protéger

Mettre si possible une muselière pour éviter d'être mordu (douleur, peur...). Glisser une boucle autour du museau, et faire un nœud, passer ensuite en dessous du museau pour un deuxième nœud, attachez ensuite derrière le cou du chien.



Dans le cas d'une plaie au thorax, il faut mettre des compresses sur la plaie, entourer le thorax d'une bande ou d'un linge pour maintenir les compresses.

En cas d'éventration, avec les viscères digestifs apparents il faut envelopper la plaie dans un linge propre et humide et coucher le chien de façon à ce que la plaie soit vers le haut.

A la suite de quoi, il faut **emmener immédiatement le chien dans un service d'urgences vétérinaires.**



Il ne faut surtout pas chercher à rentrer les organes dans le corps du chien. En effet, les plaies dues aux sangliers sont souvent très souillées (terre, débris de feuilles, d'herbes...) et le risque infectieux est important.

En outre, cela complique le travail du vétérinaire qui généralement doit ressortir les organes qui ont été en contact avec l'extérieur pour les nettoyer méticuleusement. C'est d'ailleurs ce qui prend généralement le plus de temps. Il importe de bien contrôler tous les chiens après la chasse.



La moindre plaie doit faire l'objet d'une désinfection classique. Vous pouvez disposer d'une agrafeuse à peau pour suturer les plaies, lesquelles doivent impérativement être parfaitement nettoyées et désinfectées avant.

Dans tous les cas, un chien qui se fait blesser par un sanglier doit être considéré comme une urgence vétérinaire. En effet, il faut se méfier des petites plaies en surface parce qu'il y a souvent des lésions plus graves en profondeur avec des hémorragies internes possibles.

Le pneumothorax

Le pneumothorax correspond chez le chien à la présence anormale d'air autour des poumons. Suite à un traumatisme, de l'air peut fuir et comprimer le poumon qui a moins de place pour se remplir d'air.

Dans la majorité des cas, c'est un choc violent qui entraîne une petite brèche en interne dans le poumon ou une plaie pénétrante du poumon.

Pour un pneumothorax peu ou moyennement important, on ne fait rien. La résorption de l'air se fait spontanément et progressivement.

Dans les cas sévères, il faudra que le vétérinaire réalise une ponction pour évacuer l'air. Une chirurgie est parfois même nécessaire.




Quoi qu'il en soit, une gêne respiratoire majeure doit conduire directement et immédiatement le chien chez le vétérinaire.

Le syndrome de dilatation torsion de l'estomac

Le syndrome de dilatation torsion de l'estomac chez le chien est une affection qui débute avec la distension de l'estomac par des aliments ou des liquides ou bien encore par de l'air du fait d'une respiration haletante.

L'estomac dilaté peut alors tourner sur lui-même lorsque le chien est en pleine course. Cela entraîne l'occlusion de la voie d'entrée de l'œsophage et de la voie de sortie vers l'intestin. Les aliments, les liquides et l'air ne peuvent alors ressortir.



+ ▸ Les signes cliniques sont :

- Des signes d'agitation et d'anxiété de l'animal,
- Des efforts improductifs de vomissements,
- Une pâleur des babines et des gencives,
- Une fréquence cardiaque très élevée et un pouls très faible.



Les animaux sont alors généralement très faibles et nécessitent une prise en charge rapide et associant tous les soins intensifs nécessaires, 90% des chiens traités et opérés survivent. La fixation préventive de l'estomac (gastropexie) permet de prévenir le risque de dilatation-torsion d'estomac au cours de la vie de l'animal.

Nourrir ou ne pas nourrir avant et en action de chasse ? :

En fait, il importe de ne pas trop nourrir juste avant l'effort. Mais on conseille de nourrir un petit peu pendant l'action de chasse. Cela est surtout vrai pour les lignées de chiens « *no limit* » qui chassent, chassent et chassent encore sans s'arrêter au point d'en être perclus de crampes. Ces chiens peuvent facilement tomber en hypoglycémie. Une poignée de croquettes fait alors amplement l'affaire.



Il faut également **donner la possibilité aux chiens de boire régulièrement** si le territoire ne permet pas un abreuvement naturel de telle sorte qu'ils ne se gavent pas littéralement d'eau quand ils en croisent.



Maladies Transmises par les tiques



Les tiques sont connues pour transmettre différentes maladies. C'est au cours de leurs « repas de sang » que les tiques peuvent transmettre des maladies graves et parfois mortelles.

La maladie de Lyme (aussi appelée Borréliose)

La tique contamine en transmettant une bactérie.

Les symptômes de cette maladie se caractérisent par la boiterie, les articulations chaudes, douloureuses et gonflées (arthrite, polyarthrite), la fièvre, les ganglions et l'abattement.


L'Erlchiose



La tique transmet une bactérie. Cette maladie surgit quelques jours à quelques semaines après la morsure de la tique.


+ Les symptômes de cette maladie sont :

- Les saignements de nez,
- Une forte fièvre,
- De gros ganglions,
- Une grosse rate,
- L'anorexie et l'anémie.



La piroplasmose (ou Babésiose)

C'est l'une des maladies parasitaires les plus fréquentes chez le chien, elle tue encore de nombreux chiens chaque année en France. Cette maladie est due à un parasite (protozoaire) transmis par les tiques, qui détruit les globules rouges. Le traitement est efficace à condition d'être mis en place à temps.



✚ ▶ **Les symptômes** sont en général assez marqués :

- Le chien est abattu,
- Il refuse de se nourrir, il peut aussi vomir.
- Il présente une forte fièvre (souvent 40°C), il boit beaucoup.
- Ses urines prennent une coloration anormale : orange, rouge, ou marron foncé.



Il y a là une urgence vétérinaire et le traitement doit être mis en place le plus rapidement possible.

Le meilleur moyen d'éviter à votre chien qu'il n'attrape une maladie liée aux tiques reste encore **la prévention**. Il est donc fortement conseillé de « **prévenir plutôt que guérir** ».

L'utilisation d'antiparasitaires externes doit être systématique de mars à décembre. Un antiparasitaire efficace devra agir par contact et avoir un effet répulsif. C'est la méthode la plus sûre contre la piroplasmose.

En outre, **il est nécessaire de retirer les tiques le plus rapidement possible, avant qu'elles ne commencent à se nourrir.**



Chenilles processionnaires

En cas de contact ou d'ingestion, il faut rapidement nettoyer la bouche et les muqueuses à l'eau. **Ne frottez pas**, cela pourrait casser les poils urticants et aggraver les symptômes.



On conseille pendant 5 à 10 minutes de passer la bouche de chiens et les muqueuses au jet d'eau, avant de l'amener chez le vétérinaire qui pourra assurer un traitement à base d'antibiotique, d'un pansement digestif et de perfusion...



Il est très important de **reconnaître les premiers symptômes** : gonflement des babines accompagnées d'une salivation abondante, toux, vomissements, votre chien se frotte les babines et le museau, inflammation des zones de contact, desquamation de la zone de contact, nécrose...

Vipères

L'animal qui se fait mordre avec une inoculation de venin (les morsures « sèches », sans injection de venin sont fréquentes) présente des signes cliniques dans les 30 minutes à 3 heures suivant la morsure.

La trace des crochets est visible sur la peau et elle est bien caractéristique : 2 plaies punctiformes distantes de 0.5 à 1 cm. Quasi systématiquement il se forme un œdème tout le temps suivi d'une nécrose des tissus et une douleur qui va de pair. Des symptômes plus généraux peuvent survenir comme de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements, des troubles cardiorespiratoires, des convulsions, une paralysie...



il vous faut consulter au plus vite un vétérinaire. Dans l'attente de rencontrer l'homme de l'art, évitez de stresser votre animal. Si cela est possible, portez-le et **ne faites surtout pas de garrot**. Inutile d'essayer de réchauffer le point de morsure, le venin se diffuse et surtout résiste à la chaleur.



L'appel d'urgence au vétérinaire

Comment procéder ?



1 - Message d'appel

- Nom
- Coordonnées téléphoniques

2 - Animal

- Race
- Taille
- Age
- Sexe
- Antécédents

3 - Quel est le problème ?

- Blessure
- Intoxication,
- Etc...

4- Localisation

- Expliquer le plus précisément possible le lieu de l'évènement si intervention sur place

5- État de l'animal et les premiers gestes effectués

- Indiquer les gestes effectués et le résultat de votre examen



Répondre aux questions du vétérinaire précisément
Appliquer les consignes données
Ne raccrocher qu'au signal du vétérinaire

Vos numéros utiles :

	
Votre Vétérinaire :	
Centre anti poison :	
Lyon :	04 78 87 10 40
Nantes :	02 40 68 77 40

