



Histoire de fleurs

N°2

Novembre 2018

Séneçon de Rodez
Senecio Ruthenensis
Pages 2-3

Grande marguerite
Leucanthemum vulgare
Pages 4-5

Anémone pulsate tardive
Pulsatilla rubra var serotina
Pages 6-7

Glossaire
Page 8

Édité par :

Fédération des Chasseurs de l'Aveyron
9 rue de Rome – Bourran -BP 711
12007 RODEZ Cedex
fdc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>



Senéçon de Rodez

Sénéçon de Rodez
Senecio Ruthenensis

PLANTE VIVACE

Plante vivace de 30 à 60 cm.
Tiges dressées, fermes,
pubescentes.


Feuilles : pubescentes,
denticulées ou presque
entières, décroissantes
brusquement en pétiole ailé. Les
supérieures, plus petites,
sessiles, demi-embrassantes.

Fleurs : Jaunes.

Période de floraison :
de Juin à Juillet.

Type de fruit : achaines glabres
un peu plus court que l'aigrette.

Distribution, Habitat : pelouses
sèches, ourlets herbacés et
manteaux ligneux. Endémique
du causse Comtal et de
Charente-Maritime



Usages, propriétés : Pelouse sèches

Senecio Ruthenensis



Grande Marguerite

Grande Marguerite
Leucanthemum vulgare

COMPOSEE

Plante vivace
de 30 cm à 80 cm.

Tiges : dressées, raides, striées,
anguleuses

Feuilles :
irrégulièrement dentées,
lobées. Les inférieures
oblongue-ovales, longuement
pétiolées, les supérieures demi
embrassantes.

Fleurs :
Capitules à fleurs blanches.
Involucre à folioles bordées de
brun.

Période de floraison :
De mai à août.

Type de fruit : noirâtre à 10
côtes longitudinales saillantes.

Distribution, habitat : prairies
surtout de fauche, bord de
route. Présente dans tout le
département.



Usages, propriétés : cultivée comme
plante ornementale.

Leucanthemum vulgare



Anémone pulsatille tardive

Anémone pulstaille
tardive
Pulsatilla rubra var
serotina

RENONCULACEES

Plante vivace, de 10 à 30 cm.

Tiges : poilues

Feuilles : poilues, divisées en segments étroits.

Fleurs : d'un brun rouge, penchées ou inclinées.

Type de fruit : formé de carpelles à long style persistant et plumeux. Les fruits sont portés haut sur tige, dépassant largement les fleurs.

Distribution, habitat : endémique des causses, pelouses sèches, rocailles, affectionne les terrains calcaires, rare dans le nord de la France et la région méditerranéenne, présente sur tous les causses aveyronnais.



Usages, propriétés plante toxique et dangereuse pour les bestiaux, ces derniers la consomment en revanche sans problème dans les foin, car la substance vénéneuse disparaît par la dessiccation. Cultivée comme plante ornementale

Cardamine pratensis L

Glossaire

Achaines :

Fruit sec ayant la particularité de ne posséder qu'une seule graine comme le gland

Aigrette :

Faisceau de poil porté par divers fruits et graines et qui favorisent leur dispersion par le vent.

Carpelle : pièce florale située au sommet de l'axe de la fleur et soudée aux pièces homologues pour constituer le pistil, organe femelle contenant des ovules.

Capitules :

Le mot capitule définit une **inflorescence**.

Cette inflorescence est formée de petites fleurs serrées les unes contre les autres donnant l'impression de former une seule fleur.

Glabres :

Dépourvu de poils

Involucre : désigne une collerette d'écaillés.

Lobée :

Divisé en lobes ; qui présente des découpures arrondies.

Oblongue :

De forme allongée.

Pétiole :

Le pétiole est la pièce végétale qui relie le **limbe** de la feuille à la tige (le limbe correspond à la partie large et aplatie de la feuille).

Pubescentes :

Qui est couvert d'un duvet de poils fins et courts.

Sessiles :

Inséré directement sur l'axe et dépourvu de pédoncule

